Vorteile der Nutzung von Phosphor-Recyclingdüngern aus thermisch behandelten Abfällen

Anika Zacher, Peter Leinweber

Hintergrund

Herstellung der Knochenkohle^{plus}

Herstellung der Klärschlammbiokohle

Knochenkohle^{plus} erhöht P-Aufnahme von Mais

Abb. 1: P-Aufnahme durch Mais (Mittelwert und Standardabweichung) im sechsjährigen Gefäßversuch (2016 – 2021) mit unterschiedlichen P-Düngern (TSP: Triplesuperphosphat, BC: Knochenkohle, BC^{plus}: Knochenkohle^{plus}). Kleinbuchstaben markieren signifikante Unterschiede zwischen den Düngevarianten ($p < 0,05$).

Klärschlammbiokohle erhöht P-Entzüge und Silomaiserträge

Abb. 2: Silomaiserträge (Mittelwert und Standardabweichung) im dreijährigen Feldversuch (2021 – 2023) mit unterschiedlichen P-Düngern (P0: Kontrolle ohne P, TSP: Triplesuperphosphat, BC: Klärschlammbiokohle). Kleinbuchstaben markieren signifikante Unterschiede zwischen den Düngevarianten ($p < 0,1$).

Schlussfolgerung

- Klärschlammbiokohle und Knochenkohle^{plus} setzen Phosphat relativ konstant über längere Zeiträume frei
- hohes Potenzial für die Nutzung als Langzeit-P-Dünger in der landwirtschaftlichen Praxis

Danksagung

Die Autoren danken dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für die Förderung des BonaRes Projektes InnoSoilPhos (FKZ 031B1061A).